

RECOLECCIÓN DE MATERIA FECAL COPROLÓGICO, COPROSCÓPICO Y SANGRE OCULTA EN HECES

REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA

- Recolectar la muestra en un recipiente de boca ancha. El recipiente puede ser solicitado en Laboratorio o comprado en una farmacia.
- No aplicar supositorios.
- Si es mujer, no recoger la muestra durante el ciclo menstrual.
- Si presenta hemorroides avisar al personal de la recepción.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA

- Al momento de la deposición, obtenga la muestra evitando que se contamine con orina, agua, tierra o con detergentes utilizados en la limpieza.
- Con la espátula, recolecte una pequeña cantidad de materia fecal e introdúzcala en el recipiente de recolección.
- Tape el recipiente y marque con nombre completo del paciente e identificación.
- Transporte al laboratorio en menos de 2 horas después de su recolección.
- En bebés y adultos que no controlan la deposición, puede utilizar un pañal plástico al revés, de tal manera que la parte absorbente quede hacia afuera. Nunca recoger la muestra de la parte absorbente del pañal porque se contaminará.
- Si le solicitan un examen seriado debe recoger la muestra por tres días diferentes siguiendo las mismas recomendaciones.

- Sangre oculta [Guayaco] El Alcohol, aspirina y otros medicamentos tomados en exceso pueden causar irritación gastro intestinal resultando en sangrado oculto. Se recomienda suprimir estas sustancias se al menos 48 horas antes de la prueba.
- No se necesita ninguna restricción de dieta.