

ANTÍGENO ESPECÍFICO DE PRÓSTATA PSA-AEP FRACCIÓN TOTAL, LIBRE O AMBAS

REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA

- Si le han realizado procedimientos de biopsia, prostatectomía o masajes prostáticos, espere al menos 8 días para realizarse el PSA.
- Desde 2 días antes de la toma de la muestra evite ejercicios intensos en bicicleta estática o móvil o montar a caballo.
- Es recomendable no tener relaciones sexuales ni masturbación desde dos días antes del examen.
- No estar sondeado. No haberse realizado cistoscopia o biopsia 48 horas antes.
- Informe al personal del laboratorio sobre los medicamentos que se encuentra tomando, ya que algunos fármacos provocan que el nivel del antígeno prostático específico sea falsamente bajo.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA

- Se extrae sangre de una vena (venopunción), por lo general, del pliegue interno del codo o del dorso de la mano. Se inserta una aguja en la vena y se recoge la sangre en un tubo.
- Puede sentir un pinchazo o sensación de picadura cuando se inserta la aguja. Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil o un ligero hematoma, los cuales desaparecen pronto.